

*Please read this leaflet carefully and use under the guidance of a physician*

## CAPMETA (Capmatinib Tablets)

[Drug Name] CAPMETA (Capmatinib Tablets)

### [Composition]

Active Ingredient: Each film-coated tablet contains Capmatinib 200 mg.

Excipients: Starch, Microcrystalline Cellulose, Lactose, Magnesium Stearate, Sorbitol, Sodium Starch Glycolate.

[Description] Yellow oval-shaped film-coated tablet.

[Indications] Indicated for the treatment of adult patients with metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) with a mutation that leads to mesenchymal-epithelial transition (MET) exon 14 skipping.

### [Dosage and Administration]

Recommended Dose: 400 mg (2 tablets) orally twice daily.

Administration: Swallow tablets whole. Do not crush, chew, or break. Take with or without food.

Missed Dose: If a dose is missed or vomiting occurs, do not make up the dose. Take the next dose at the scheduled time.

[Adverse Reactions] Common side effects include swelling of hands/feet (edema), nausea, fatigue, vomiting, shortness of breath, and decreased appetite.

Photosensitivity: This drug may cause sensitivity to sunlight. Cover your skin and use sunscreen during treatment.

[Contraindications] Hypersensitivity to Capmatinib or any of the excipients.

### [Precautions]

Lung Problems: Monitor for new or worsening cough or trouble breathing (ILD/Pneumonitis).

Liver Problems: Regular blood tests to check liver function are required.

Sun Sensitivity: Avoid direct sunlight or tanning beds.

Pregnancy: Do not use if pregnant. Use effective contraception during treatment.

[Storage] Store below 30°C in a dry place, protected from moisture and light. Keep out of reach of children.

[Packaging] HDPE bottle. 60 tablets per bottle.

[Shelf Life] 24 months

[Approval Number / Reg. No.] Reg. No. (Laos): [ ]

[Manufacturer] ViengKham Pharmaceutical Co., Ltd.  
Address: ViengKham District, Vientiane Province, Lao PDR.

[Revision Date] 09 January 2026

ກະລຸນາອ່ານເອກະສານກຳກັບຢານີ້ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ໃຊ້ຢາພາຍໃຕ້ການແນະນຳຂອງແພດ

## CAPMETA (Capmatinib Tablets)

[ຊື່ຢາ]CAPMETA (Capmatinib Tablets)

### [ສ່ວນປະກອບ]

ຕົວຢ່າສຳຄັນ: ໃນແຕ່ລະເມັດເຄືອບຟິມ ປະກອບດ້ວຍ **Capmatinib 200 mg**.

ສານຊ່ວຍ (Excipients): **Starch** (ແປ້ງ), **Microcrystalline Cellulose** (ໄມໂຄຣຄຣິສຕັລລິນ ເຊວລູໂລສ), **Lactose** (ແລັກໂຕສ), **Magnesium Stearate** (ແມັກນີຊຽມ ສະເຕຍເຣດ), **Sorbitol** (ຊີບິທອລ), **Sodium Starch Glycolate** (ໂຊດຽມ ສະຕາດ ກຼີໂກເລດ).

[ລັກສະນະຂອງຢາ] ຢາເມັດເຄືອບຟິມ ສີເຫຼືອງ ຮູບຊົງໄຂ່ (Yellow oval-shaped).

[ຂໍ້ບົ່ງໃຊ້] ບົ່ງໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວຜູ້ປ່ວຍຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ເປັນມະເຮັງປອດຊະນິດທີ່ບໍ່ແມ່ນຈຸລັງນ້ອຍ (NSCLC) ໄລຍະແຜ່ກະຈາຍ ທີ່ມີການກາຍພັນຊະນິດ mesenchymal-epithelial transition (MET) exon 14 skipping.

[ຂະໜາດ ແລະ ວິທີໃຊ້]

ຂະໜາດຢາທີ່ແນະນຳ: **400 ມລກ (2 ເມັດ)** ກິນທາງປາກ ມື້ລະ **2** ເທື່ອ.

ວິທີໃຊ້: ໃຫ້ກິນຢາທັງເມັດ, ຫ້າມບົດ, ຫຍ້າ ຫຼື ຫັກເມັດຢາ. ສາມາດກິນພ້ອມອາຫານ ຫຼື ບໍ່ພ້ອມອາຫານກໍໄດ້.

ກໍລະນີລຶມກິນຢາ: ຖ້າຫາກລຶມກິນຢາ ຫຼື ມີອາການຮາກອອກ, ບໍ່ໃຫ້ກິນຢາເພີ່ມທົດແທນ. ໃຫ້ກິນຢາຄັ້ງຕໍ່ໄປຕາມເວລາປົກກະຕິ.

[ອາການບໍ່ເພິ່ງປະສົງ] ອາການຂ້າງຄຽງທີ່ພົບເລື້ອຍ ໄດ້ແກ່ ອາການບວມຢູ່ມື/ຕີນ, ປວດຮາກ, ອ່ອນເພຍ, ຮາກ, ຫາຍໃຈຜິດ ແລະ ເນື້ອອາຫານ.

ອາການແພ້ແສງ (Photosensitivity): ຢານີ້ອາດເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງໄວຕໍ່ແສງແດດ. ຄວນປົກປິດຜິວໜັງ ແລະ ທາຄືມກັນແດດ ໃນລະຫວ່າງການປິ່ນປົວ.

[ຂໍ້ຫ້າມໃຊ້] ຫ້າມໃຊ້ໃນຜູ້ທີ່ແພ້ຕໍ່ **Capmatinib** ຫຼື ສ່ວນປະກອບໃດໆຂອງຢານີ້.

### [ຂໍ້ຄວນລະວັງ]

ບັນຫາທາງປອດ: ໃຫ້ຕິດຕາມອາການໄອ ຫຼື ຫາຍໃຈຜິດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ຫຼື ຮຸນແຮງຂຶ້ນ (ILD/Pneumonitis).

ບັນຫາທາງຕັບ: ຈຳເປັນຕ້ອງກວດເລືອດເພື່ອເບິ່ງການເຮັດວຽກຂອງຕັບຢ່າງສະຫມໍ່າສະເຫມີ.

ຄວາມໄວຕໍ່ແສງ: ຫຼີກລ່ຽງແສງແດດໂດຍກົງ ຫຼື ການອາບແສງ.

ການຖືພາ: ຫ້າມໃຊ້ໃນຍິງຖືພາ. ໃຫ້ຄຸມກຳເນີດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນລະຫວ່າງການປິ່ນປົວ.

[ການເກັບຮັກສາ] ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າ **30° C** ໃນບ່ອນແຫ້ງ, ປ້ອງກັນຈາກຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ແສງ.ເກັບໃຫ້ພົ້ນມີເດັກນ້ອຍ.

[ຂະໜາດບັນຈຸ] ຂວດ HDPE. ບັນຈຸ 60 ເມັດຕໍ່ຂວດ.

[ອາຍຸການເກັບຮັກສາ] 24 ເດືອນ

[ເລກທະບຽນຢາ / Reg. No.]**Reg. No. (Laos): [ ]**

[ຜູ້ຜະລິດ]ViengKham Pharmaceutical Co., Ltd.ທີ່ຢູ່: ເມືອງ ວຽງຄຳ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ (ViengKham District, Vientiane Province, Lao PDR).

[ວັນທີແກ້ໄຂເອກະສານ] 09 ມັງກອນ 2026